こどもの予防接種

※転出された方は中野市の予診票は使えませんので、転入先の市町村にご相談ください。

接種ワクチン (予防する病 気)	ロタウイルス		B型肝炎 (B型肝炎)	小児用肺炎球菌 (15価・20価) (小児の肺炎球菌感 染症)	五種混合 ジフテリア百日せき 破傷風 ポリオ ヒブ	BCG (結核)	水痘 (水ぼうそう)	麻しん・風しん 混合 (はしか、風しん)	日本脳炎 (日本脳炎)
	ロタリックス	ロタテック (ロタウイルス胃腸炎)							
接種対象 年齢	生後6週0日 ～ 24週0日	生後6週0日 ～ 32週0日	1歳未満	生後2か月～ 5歳未満	生後2か月～ 7歳6か月未満	1歳未満	1歳～3歳未満		3歳～ 7歳6か月未満
接種間隔 及び回数	2か月～24週 0日に27日以 上の間隔をお いて2回	2か月～32週 0日に27日以 上の間隔をお いて3回	【1回目と2回目】 27日以上の間隔を おく 【3回目】 1回目から139日 (20週)以上の間 隔をおく ※初回接種は2か月から 生後14週6日までに行う	【初回(3回)】 2か月～7か月未満に 27日以上の間隔をお いて3回 【追加(1回)】 初回3回目から 60日以上あけ、生後 12か月～15か月の間 に1回	【1期初回(3回)】 2か月～1歳未満に 20～56日間隔をおい て3回 【1期追加(1回)】 1期初回3回目から 6か月～18か月の間隔 をおいて1回	標準は生後5か月 ～8か月未満の間に1 回	【1回目】 生後12か月～15か 月の間に1回 【2回目】 1回目から6か月～ 12か月の間隔を おく	【第1期(1回)】 生後12か月～24 か月未満に1回 【第2期(1回)】 年長児(就学1年 前)	【1期初回(2回)】 6～28日間隔で2回 【1期追加(1回)】 1期初回2回目からおお むね1年後に1回
	ワクチンの 種類	経口生ワクチン		不活化ワクチン	不活化ワクチン	不活化ワクチン	注射生ワクチン	注射生ワクチン	注射生ワクチン
接種場所	委託医療機関								
注意事項	◎原則として、同一のワクチンで接種を完了してください。		◎出生後母子感染で予防のためにB型肝炎ワクチンの接種を受けている場合は、定期接種の対象にはなりません。				◎予診票は7か月児健診でお渡します。 ◎水痘にかかったことがある方は接種できません。	◎第1期の予診票は7か月児健診でお渡します。 ◎第2期の対象方には個別に通知します。 ◎原則として、麻しん風しん混合ワクチンを接種します。	◎予診票は3歳児健診でお渡します。 ◎3歳未満でも予防接種が出来ます。海外へ渡航される等のお問合せください。
◎生後1か月以内に、予診票を送付いたします。									

【予防健康被害救済制度】 予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避免的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、下記にご相談ください。

おたふくかぜ予防接種助成事業

- ◇対象者 ①1歳～2歳の誕生日前日まで ②就学1年間(年長児)
- ◇助成額 各対象時期 1人1回 3,000円
- ◇接種方法:中野市の委託医療機関に予約し、医療機関においてある予診票で接種し、接種費用から3,000円を引いた額を医療機関に支払う。

子どもインフルエンザ予防接種助成事業

- ◇対象者:生後6か月から15歳(中学3年生)まで
- ◇助成額・回数:1人1回につき、接種金額の1/2の金額(上限1,000円) 1人2回まで(ただし13歳以上の方は原則1回まで)
- ◇接種医療機関:中野市内の実施医療機関のほか、市外医療機関での接種も可能です。
※市外医療機関で接種される場合は、必ず事前に健康づくり課窓口にお越しいただくか、お電話にてお問い合わせください。

定期予防接種スケジュール

接種推奨期間

接種可能な期間

接種するワクチン (予防する病気)	乳児期											幼児期						学童期												
	生後直後	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12~15か月	16~17か月	18~23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	
ロタウイルス (ロタウイルス 胃腸炎)	経口生		①	②																										
	経口生		①	②	③																									
B型肝炎 (B型肝炎)	不活化		①	②				③																						
小児用肺炎球菌 (小児の肺炎球菌感染症)	不活化		①	②	③							④																		
五種混合 (ジフテリア、百日咳、破傷風、 ポリオ、ヒブ感染症)	不活化		①	②	③								④																	
BCG (結核)	生					①																								
麻しん・風しん (はしか、風しん)	生											①																		
水痘 (水ぼうそう)	生											①			②															
日本脳炎 (日本脳炎)	不活化															①	③						小4 ④							
二種混合 (ジフテリア、破傷風)	不活化																							小6①						
子宮頸がん (子宮頸がん)	不活化																											中1 ①② ③		

初回接種は生後14週6日までに行いましょう

※接種回数は接種開始の月齢・年齢毎に異なります。
詳しくは、お問い合わせください。

小学校入学前の1年間